

Tabel van Algemene Sitrus Siektes

Naam van siekte	Identifikasie	Besonderhede	Simptome en skade veroorsaak	Voorkoming/ Beheer
Grondgedraagde siektes				
<i>Phytophthora</i> (<i>Phytophthora citrophthora</i>)		• Swamsiekte • Affekteer plantdele onder en bo die grond (wortelstelsels, stamme, takke, blare) • Kom veral voor tydens lang tydperke van reën • Bome in groeimedium wat swak gedreineer is, wat anaërobiese toestande teweegbring, is hoogs vatbaar	• Swak groei, kleiner bome • Voedingstofsteurnisse as gevolg van skade aan voedingswortels • Gummosis	• Sterilisering van groeimedia • Sterilisering van ontkiemings- en saailingbakke • Sterilisering van kwekerygereedskap en -toerusting • Algemene kwekery sanitasie • Waterbehandeling • Lig plante van grond af op • Gereelde monsterneming en toetsing van groeimedium • Indien positief, kan bome eenmaal behandel word • Indien weer positief toets, moet bome vernietig word • Chemikalieë met voorkomende en helende eienskappe is geregistreer
Nematodes		• Nematodes kom selde in sitruskwekerye voor omdat groeimedia steriliseer word • Plantparasitiese nematodes is baie klein en kan nie met die blote oog gesien word nie • Sitrusnematodes val die wortelstelsels van sitrusbome aan	• Bome het simptome van voedingstekorte • Sigbare skade aan wortelstelsels	• Behoorlike sterilisering van groeimedia • Stuur een maal per jaar monsters na diagnostiese sentrum om getoets te word • Gebruik geregistreerde nematodebeheerders indien groeimediummonsters enige tekens van besmetting toon

Tabel van Algemene Sitrus Siektes

Naam van siekte	Identifikasie	Besonderhede	Simptome en skade veroorsaak	Voorkoming/ Beheer
Sitruswartvlek		• Sitruswartvlek is 'n siekte wat nie in 'n kwekery verdra mag word nie • Infeksie word deur warm vogtige toestande in die somer en die teenwoordigheid van oorfloedige inokulum aangehelp • Die primêre bron van infeksie is spore wat op die grond ontwikkel • Spore word kragtig geprojekteer op blare tydens reën of besproeiing	• Geaffekteerde blare wys selde simptome van die siekte • Indien simptome aanwesig is, wys hulle as klein dooie kolle met 'n grys middelpunt en 'n geel rand	• Dien elke 28 dae goedgekeurde kontak-swamdoders toe in areas waar swartvlek voorkom, as deel van 'n chemiese spuitprogram, wat van die middel van Oktober tot die middel van Januarie verpligtend is in die kwekery • Algemene kwekerysanitasie, en veral die verwydering van blaarafval
Ent-oordraagbare siektes				
Tristeza		• Virussiekte • Virus word deur plantluise oorgedra • Swak boomgroei as gevolg van afsterwing en dood van geleidingsweefsel (houtweefsel) by die entlas • Suikers wat deur fotosintese in blare vervaardig word, word geblokkeer en kan nie na wortels vervoer word nie	• Swak groei / skielike swak groei • Verwelking • Insterwing • Blaarchlorose en opkrulling • Heuningkoekagtige vorming • Entlas verkleur • Oormatige groei van entlote • Verdikte bas by entlas • Styseluitputting in wortels • Verlies van voederwortels	• Vektorbeheer (plantluise) • Gebruik voortplantingsmateriaal wat vooraf met 'n matige Tristeza virus geïmmuniseer is

Tabel van Algemene Sitrus Siektes

Naam van siekte	Identifikasie	Besonderhede	Simptome en skade veroorsaak	Voorkoming/ Beheer
Sitrusvergroeningsiekte		- Bakteriële siekte - Loop uit op 'n chroniese swak groei van sitrus - Sitrusbladvlooi (Citrus psylla Trioza) is die draer van die bakterie	- Blaar-are word aanvanklik geel - Blaarsimptome mag soos sink tekort lyk - Blare is klein, wys boontoe en toon chlorose (vergeling)	- Beheer die vektor (bladvlooi) – daar mag geen tekens van bladvlooi in kweekstrukture in kwekery wees nie - Gebruik voorkomende spuitprogram - Hou bome in insek vrye tonnels - Verwyder bron van inokulum deur die geïnfecteerde bome te verwyder
<i>Exocortis</i>		- Virussiekte - Veral op bome wat op driebladige, citrange en Rangpur-lemmetjie-wortelstok geënt is - Word deur geïnfecteerde enthout versprei	- Afskilfering van bas en verknottig van bome - Sommige kultivars toon tak vlekke, bassplintering, of aar nekrose - Sommige kultivars soos pomelo's, soetlemoen en nartjies kan infeksie sonder simptome hê, maar wanneer dit op sensitiewe wortelstokke geënt word, kan afskilfering van bas en verknottig van bome voorkom	- Gebruik virus-vrye enthout wat van lootpunt enting verkry is - Steriliseer snoeigereedskap